

31 DE MAYO DE 2015 #DiaMundialSinTabaco

FUMAR CAUSA CEGUERA

El HUMO DEL TABACO contiene más de
4.000 SUSTANCIAS QUÍMICAS



Entre otras contiene: Monóxido de carbono, Nicotina (insecticida), Arsénico (veneno), Cadmio (baterías), Tolueno (disolvente), Metanol (combustible), Metano (gas tóxico) y Amoniaco (limpiador).

Los FUMADORES tienen un
RIESGO 4 VECES MAYOR
DE PADECER **CEGUERA**
en la vejez



LOS FUMADORES PASIVOS **DOBLAN** el riesgo de sufrir
Degeneración Macular
Asociada a la Edad



Y las MUJERES FUMADORAS mayores de 80 años tienen
5,5 VECES MÁS posibilidades de padecer **DMAE**

EL TABACO DAÑA LOS TEJIDOS OCULARES, siendo el
ÚNICO RESPONSABLE del

25 % DE CASOS DE DMAE
y pérdidas severas de visión



Las MUJERES QUE FUMAN DURANTE EL EMBARAZO
aumentan el riesgo de que el bebé desarrolle

ESTRABISMO o
RETINOPATÍA DEL PREMATURO,
así como otros problemas sistémicos



Las **CATARATAS** son la
1ª CAUSA MUNDIAL DE PÉRDIDA DE VISIÓN.
Estudios demuestran que **LOS FUMADORES**
DOBLAN SU RIESGO

CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL SIN TABACO,
EL INSTITUT DE LA MÀCULA I DE LA RETINA
OS INFORMA SOBRE ALGUNOS DE LOS DAÑOS DEL TABACO.

¡Mira por tus ojos!

Tabaquismo y Ceguera

El fumar puede provocar la ceguera a edad más temprana, de acuerdo con los estudios realizados por un grupo de científicos canadienses que investigaron la degeneración macular. La mácula es el centro principal de la visión en la retina. Los fumadores tienden a tener una forma de degeneración macular mucho antes que los no fumadores. Los tres doctores que realizaron el estudio descubrieron que la edad promedio para la ceguera en los fumadores era los 64 años, mientras que en los no fumadores la edad era 71.



INSTITUT
DE LA MÀCULA
I DE LA RETINA

Institut de la Màcula i de la Retina
Hospital General Tàrragona
Tel.: +34 93 395 01 55
www.institutdelamaculairetina.com

